

Description d'un *Hylophilus* du Japon [COL. HETEROMERA]

par Maurice Pic.

Hylophilus Grouvellei. n. sp. — *Oblongo-ovalis, subnitidus, griseo pubescens, rufo-testaceus, oculis et femoribus posticis pro parte nigris.*

Oblong-ovale, peu brillant, pubescent de gris, à pubescence couchée ou très peu soulevée, entièrement roux-testacé avec les yeux et les fémurs postérieurs en majeure partie noirs. Tête pas plus large que le prothorax, d'un roux un peu rembruni, tronquée postérieurement, densément ponctuée; yeux assez gros, éloignés entre eux, touchant presque le bord postérieur de la tête; antennes assez robustes et longues, à 2^e et 3^e articles courts, à peu près égaux, 4^e plus grand et épaissi ainsi que les suivants, dernier pas très long, acuminé au sommet; prothorax court, un peu rétréci en arrière, à angles antérieurs arrondis, très densément ponctué; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, rétrécis postérieurement, fortement et densément ponctués, à épaules très arrondies avec une très faible dépression antérieure; pattes testacées, assez longues, cuisses postérieures épaissies et presque complètement noires. — Long. : 2,5 mill.

Japon : Kioto (coll. Pic).

C'est avec un vif plaisir que je dédie cette espèce à mon excellent collègue A. GROUVELLE par l'intermédiaire de qui je l'ai reçue.

H. Grouvellei est très voisin de *rufulus* Mars.; en outre de sa structure antennaire, il en diffère par le prothorax très arrondi sur les angles antérieurs et les cuisses postérieures foncées.

Je ne crois pas me tromper en attribuant comme ♀ à la même espèce un exemplaire, de Kioto, ayant une forme plus élargie et les antennes moins robustes avec le 3^e article moins court, à peu près de la longueur du 4^e, mais qui possède, comme *H. Grouvellei*, des cuisses postérieures foncées, une tête un peu rembrunie et a les angles antérieurs de son prothorax très arrondis.